



Arbustes champêtres

ACER campestre : Erable champêtre, écorce clair et liegeuse, floraison printanière donnant des fruits ailés. Feuilles jaunes d'or en automne.

AMELANCHIER CANADENSIS : Amélanchier du Canada, petit développement, feuilles ovales et dentées verte puis orange-feu en automne. Au printemps apparaissent des grappes de fleurs étoilées, suivies de baies comestibles rouges puis noires à maturité.

ARBUTUS unedo : Arbousier ou arbre aux fraises, persistant buissonnant à port dressé et à l'écorce rougeâtre écailleuse. En automne des grappes terminales de petites fleurs en formes de grelots apparaissent lorsque les fruits de l'année précédente arrivent à maturité. Les baies passent du vert au jaune, puis du rouge orangé à l'écarlate.

BUDDLEIA ile de france : Arbuste aux papillons, panicules terminales en épis formé de petites fleurs violettes attire les papillons. A croissance très rapide, il fait triste mine en cas de forte chaleur, mais sa résistance lui permet de reprendre un bel aspect peu après.

BETULA verrucosa : Bouleau blanc ou verruqueux, les branches charpentières ont un port érigées alors que les rameaux plus jeunes tendent à retomber. L'écorce blanche écaillée côtoie au printemps les fleurs mâles et femelles en forme de chatons. Les feuilles sont jaunes d'or en automne.

CARPINUS betulus : Charme commun, écorce grise et lisse, petites feuilles dentées ovales. Monoïque, le charme porte des fleurs mâles et femelles en chatons, sur le même pied au début printemps. Son feuillage est marcescent: les feuilles mortes restent accrochées aux branches.

CASTANEA sativa : Châtaignier commun, arbre monoïque (fleurs mâles et femelles sur le même pied), il fleurit en juin et donne 2 ou 3 trois châtaignes par bogue en octobre. On appelle marrons certaines châtaignes produites par des châtaigniers à fruits *non cloisonnés*, sélectionnées pour la taille des fruits. Ce qui prête à confusion avec le marron, fruit du marronnier qui n'est pas comestible.

CELTIS australis : Micocoulier de provence, arbre au port arrondi voir étalé grâce à ses branches fourchues et souples. Ses feuilles rêches ressemblent à celles des orties, les fruits noirs hivernaux sont comestibles.

CERCIS siliquastrum : Arbre de judée, petit arbre au tronc souvent penché et tortueux à l'écorce noirâtre gerçurée. Au printemps, de petites fleurs rose-vif violacé apparaissent sur les branches anciennes, suivie de petites feuilles arrondies. Les fleurs sont mellifères, elles attirent les insectes butineurs.

CHAENOMELES nivalis : Cognassier du japon, arbuste au port chaotique, fleurit blanc en fin d'hiver sur le vieux bois. Ses fruits jaunes sont comestibles après cuisson. Les lapins et les cervidés ne convoitent pas son feuillage, idéal en haie défensive.

CORNUS mas : Cornouiller mâle ou corbier, grand arbuste à floraison précoce. En fin d'hiver, ses fleurs jaunes parfumées et mellifères donnent à l'automne des petits fruits ovales rouges écarlates comestibles appelés cornouilles. Les feuilles ovales, pointues, légèrement gaufrées et nervurées sont vertes foncées, avant de devenir jaunes en automne. L'espèce doit son nom du latin *cornu*, qui veut dire corne.

CORNUS sanguinea : Cornouiller sanguin, floraison printanière blanche mis en valeur par les feuilles teintées de rouge par l'exposition due au soleil. La couleur automnale rouge-bronze des feuilles et des branches annonce l'apparition des fruits noirs non comestible pour l'homme.

CORYLUS avellana : Noisetier commun ou coudrier, arbuste à fruits et de floraison printanière. Ils sont auto stériles, malgré leurs fleurs en châtons dressés pour les femelles, et pendantes pour les mâles, il faut 2 pieds pour avoir des fruits en automne.

ELEAGNUS angustifolia : Olivier de bohême, arbuste aux branches d'abord érigées, puis légèrement arquées. Les feuilles étroites lancéolées sont vertes foncées, les faces inférieures sont couvertes d'écailles argentées. En fin printemps, les fleurs jaunes, odorantes, sont portées par les pousses écailleuses de l'année. Arrivent en fin d'été de nombreux petits fruits comestibles jaunes à rougeâtres.

EUONYMUS alatus : Fusain ailé, petit arbuste compact, aux tiges formées de 4 ailettes liégeuses. Les feuilles vertes, deviennent rouge écarlates à l'automne.

EUONYMUS europaeus : Fusain d'europe, petit arbre au port élancé, évasé, aux branches de couleurs grisâtres, crevassées et à bourrelets liégeux. Son feuillage vert, luisant, lancéolés, vire à l'orange en hiver. Sa floraison insignifiante printanière donnent de remarquables petits fruits roses en forme de citrouilles carrés, non comestibles. Ses fruits l'on fait surnommer *bonnet d'évêque*.

FAGUS sylvatica : Hêtre ou fayard, arbre érigé à long fût lisse et à l'écorce grise. Les feuilles vertes foncées, brillantes, nervurées et poilues sont marcescente en hiver : même mortes, elles restent accrochées aux branches. Plus le sujet sera isolé, plus il sera touffu.

FAGUS sylvatica purpurea : Hêtre pourpre, il a les mêmes caractéristiques que le commun, mis à part la couleur de ses feuilles qui est d'un pourpre sombre.

FRAXINUS exelsior : Frêne commun, grand arbre rustique, à cime arrondie. Tronc droit, à écorce lisse grise verdâtre, se crevassant avec l'age, ses feuilles vertes sont composées de 7 à 15 folioles dentées. Sa floraison insignifiante donnent des fruits en samares : fruit sec avec une aile membraneuse, tout comme le fruit de l'érable.

JUGLAN nigra : Noyer noir, grand arbre à fut élancé, l'écorce foncée lui à donner son nom. Ses grandes feuilles sont composées de multiples folioles, sa floraison en châtons donne des noix comestibles en automnes. Ce noyer est plus rustique et pousse plus vite que le noyer commun, il est souvent utilisé en porte greffe.

LABURNUM anagyroides : Cytise ou faux ébénier, petit arbre à écorce brune et lisse. Feuilles vertes trifoliées au revers pâle et velus. Belle floraison en grappes pendantes constituées de petites fleurs jaunes, mellifères, ponctuées de rouge en fin de printemps.

LAURUS nobilis : Laurier sauce, arbuste aromatique, qui garde ses feuilles vertes, et coriaces, en hiver. Large port colonnaire, floraison printanière constituées de petites fleurs dioïques* jaunes-blanchâtres groupées en ombrelles. Suivent ensuite des baies noires ovoïdes.

*dioïque : les fleurs mâles et femelles sont sur des pieds séparés.

Dans les écoles de médecines, la couronne dont on entourait la tête des jeunes docteurs était faite de rameaux feuillés de laurier avec des baies, d'où le nom «baccalauréat» *bacca laurea* : baie de laurier.

PARROTIA persica : Arbre de fer, grand arbuste dont l'écorce grise s'exfolie, comme le platane, faisant apparaître des plaques jaunes. Son port évasé est dû aux branches raides en V, ses feuilles vertes brillantes virent au rouges-orangées voire cramoisies en automne. En fin d'hiver, de petites fleurs à étamines rouges sans pétales apparaissent avant les feuilles.

PRUNUS avium : Merisier, cerisier sauvage ou des oiseaux, grand arbre vigoureux, à fût droit et à cime étroite et ramifiée. Floraison printanière blanche donnant des petites cerises rouges comestibles mais acidulées. Son écorce s'exfolie et ses feuilles sont de couleurs automnales rousses.

PRUNUS spinosa : Prunellier ou épine noire, petit arbuste aux branches épineuses. De petites fleurs simples blanches apparaissent au printemps, ses fruits, automnaux, sont noirs, globuleux et astringents, de plus, l'amande qu'ils contiennent est toxique. Il est idéal en haie défensive.

QUERCUS ilex : Chêne vert, arbre persistant, arrondi et dense. Petites feuilles vertes foncées coriaces aux revers blancs duveteux. Monoïques, les fleurs printanières en châtons donnent, avec un seul pied, des glands bruns oblongs. La forme de la feuille est adaptée à l'humidité ambiante : En milieu favorable, où l'humidité de l'air n'est pas limitante, il aura des feuilles à limbe presque ovale, tandis qu'en milieu sec, son préféré, les feuilles seront pour la plupart dentées.

QUERCUS robur : Chêne commun ou pédonculé, grand arbre monoïque de nos forêts. Ses feuilles, aux lobes peu marqués, s'entassent aux bouts des rameaux. Les glands, sont portés par de longues pédoncules, d'où son nom.

QUERCUS rubra : Chêne rouge d'Amérique, il se différencie du chêne commun grâce à ses larges feuilles aux lobes plus découpées et pointues devenant rouges en automne. Son écorce est grise et lisse, il donne de petits glands de couleur brun-rougeâtre.

QUERCUS palustris : Chêne des marais, originaire d'Amérique, ses feuilles sont encore plus ciselées que le chêne rouge. A croissance rapide, il apprécie les zones humides.

RHAMNUS alaternus : Néprun alaterne, petit arbuste aux petites feuilles vertes, brillantes et persistantes. Au début printemps, de petites fleurs jaunes dioïques, donnant de petites baies rouges puis noirs à maturité sur les pieds femelles. Il supporte bien la sécheresse.

RHAMNUS frangula : Néprun bourdaine, petit arbre à floraison printanière insignifiante et aux fruit noirs décoratifs mais indigestes. Son écorce brun-grisâtre est couvert de lenticelles plus claires. Les lenticelles sont les pores de l'écorce d'une plante, comme le cerisier ou le bouleau.

RHUS typhina : Sumac de Virginie, arbuste aux branches molletonnées. Ses longues feuilles à folioles lancéolées vertes et pointues deviennent rouges, voire cramoisies en automne. Plante dioïque, elle donne des fruits que sur les pieds femelles. On peut observer sa fructification automnale qui produit un fruit rouge, velus, en forme de cône.

SAMBUCUS nigra : Sureau noir, arbuste à croissance rapide. En fin printemps, il produit de petites fleurs en grandes ombrelles parfumées et nectarifère. Ses fruits noirs-violacés sont en grappes pendantes, comestibles. Le nom scientifique du sureau vient du grec "sambuca" qui était une sorte de flûte que les bergers taillaient dans un morceau de bois creux de sureau.

SOPHORA japonica : Sophora japonais ou pagode, arbre au port arrondi et au tronc se torturant en vieillissant. L'écorce verte se pare de lenticelles blanches et les feuilles sont à folioles pointues. Il fleurit au printemps de panicules terminales de petites fleurs blanches papillonacées.

SORBUS domestica : Cormier, arbre à l'écorce grise-orangée et aux feuilles pennées de *folioles* : feuilles constituées de plusieurs petites feuilles. Il fleurit au printemps de petites fleurs blanches en grappes aplaties. Les fruits, verts, tachetés de brun-rougeâtre à maturité, ressemblent à de petites pommes ou petites poires.

SYRINGA vulgaris : Lilas commun, petit arbuste à floraison printanière violette et parfumée. Son inflorescence et une grappe, de petites fleurs à 4 pétales appelée *thyrs*, comme la fleur de la vigne. Il sert de porte-greffe et fait des rejets au pied (à éliminer sur les pieds greffés).

ULEX europaeus : Ajonc d'europe, petit arbuste épineux, en touffe. Ses petites feuilles persistantes sont peu nombreuses, la photosynthèse se fait par les épines. La longue floraison jaune, hivernale et printanière est odorante. Très rustique, lumineux, idéal en haie défensive.

VIBURNUM TINUS : Laurier tin, petit arbuste persistant au port compact, à l'écorce marron-grisâtre couverte de lenticelles plus foncées. Les feuilles sont coriaces et vertes foncées. Sa longue floraison hivernale de petites fleurs blanches en grappes aplaties, donne de petites baies bleues-noires estivales. Suivent ensuite des boutons floraux roses.